

Kent u de richtlijnen?

Geef aan of deze stellingen juist of onjuist zijn:

1. Bij patiënten met vasculaire risicofactoren, maar zonder bewezen atherosclerose van de grote vaten, is het advies te behandelen met statines met een streefwaarde van een LDL-cholesterolgehalte $< 1,8$ mmol/l.

Antwoord: onjuist. De streefwaarde voor deze categorie patiënten is $< 2,5$ mmol/l. Bij patiënten met aangetoonde atherosclerose of een vermoede relatie van de TIA/het herseninfarct met atherosclerose bestaat er indicatie om te streven naar een LDL-cholesterolgehalte $< 1,8$ mmol/l. Lees de volledige richtlijn op richtlijndatabase.nl.

2. Bij patiënten met een TIA of een niet-invalidierend herseninfarct kan de duplex carotiden gebruikt worden als eerste screeningsmethode naar een atherosclerotische carotisstenose. Of de uitslag bij een stenose $> 50\%$ geverifieerd moet worden middels een contrast MR-angiografie of multislice CT-angiografie hangt af van de mate van stenosering.

Antwoord: juist. Deze verificatie is niet noodzakelijk wanneer een stenose van $> 70\%$ wordt gevonden en het duplexonderzoek lokaal gevalideerd is. Lees de volledige richtlijn op richtlijndatabase.nl.

3. Bij patiënten die in de voorafgaande 6 maanden een herseninfarct, TIA of retinale ischemie hebben doorgemaakt en een carotisstenose $> 50\%$ hebben, dient een carotidesobstructie te worden overwogen.

Antwoord: juist. Lees de volledige richtlijn op richtlijndatabase.nl.